

Protocolo clínico estructurado para el uso de **Pylofin HP** como coadyuvante en el manejo de *Helicobacter pylori*, adaptado a contextos de medicina integrativa, ozonoterapia y suplementación avanzada. Incluye criterios de indicación, dosificación, duración, seguimiento y advertencias, con enfoque práctico y segmentable para distintos públicos.

Protocolo clínico: Uso de Pylofin HP en pacientes con *Helicobacter pylori*

1. **Objetivo terapéutico**

- Reducir la carga bacteriana de *H. pylori* en pacientes sintomáticos o con diagnóstico confirmado
 - Modular la virulencia y la inflamación gástrica
 - Mejorar la tolerancia a tratamientos convencionales (antibióticos, IBP)
 - Proteger la mucosa gástrica y favorecer la recuperación funcional
-

2. **Indicaciones clínicas**

Uso complementario (coadyuvante) en:

- Terapia erradicadora convencional (triple o cuádruple)
 - Pacientes con intolerancia a antibióticos o recidivas frecuentes
 - Colonización asintomática con disbiosis o síntomas digestivos leves
 - Protocolos integrativos en ozonoterapia, suplementación o microbiota
-

3. **Posología recomendada**

Edad / Perfil

Dosis estándar Pylofin HP

Adultos (>12 años)

1 cápsula, 2–3 veces al día


Horario

30 min antes de desayuno, comida y cena

Duración mínima

4 semanas

Duración extendida (modulación) 8–12 semanas, según evolución clínica

 En caso de dificultad para tragar, puede abrirse la cápsula y verter su contenido en agua o alimento blando.

4. **Compatibilidad con otros tratamientos**

Tratamiento concomitante

Compatibilidad con Pylofin HP

Antibióticos (claritromicina, amoxicilina, metronidazol)

✓ Mejora tolerancia y eficacia

IBP (omeprazol, pantoprazol)

✓ Compatible, sin interferencias conocidas

Probióticos específicos

✓ Sinérgico (L. reuteri incluido en fórmula)

Ozonoterapia sistémica

✓ Complementario en protocolos digestivos

5. **Seguimiento clínico**

- **Semana 0:** Confirmación diagnóstica (*test de aliento, antígeno en heces, serología*)
 - **Semana 4:** Evaluación de síntomas, tolerancia y respuesta digestiva
 - **Semana 8–12:** Reevaluación microbiológica si procede (*test de control*)
 - **Registro clínico:** Anotar evolución digestiva, efectos adversos, adherencia
-

6. **Contraindicaciones y precauciones**

- No administrar en menores de 12 años
- Evitar en embarazo y lactancia (por falta de estudios concluyentes)
- Suspender en caso de reacciones adversas (náuseas, alergia)
- Consultar en pacientes inmunodeprimidos o con patologías digestivas graves